



RIGSARKIVET

INDBERETNING NR. 9



EPIDEMIER OG VIRUSSER

- den spanske syge

INDBERETNING NR. 9

SUNDHEDSSTYRELSEN

København B., Maj 1919

Jyl. [Jylland]
Aarhus Amt

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.

G. Tryde

Anders Johansen

Oplysninger om Influenza'en under dens Optraeden i Danmark i Aarene 1918-19

SUNDHEDSSTYRELSEN
København B., Maj 1919

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.
G. Tryde.

Anders Johansen.


Oplysninger om Influenza'en
under dens Optraeden i Danmark i Aarene 1918-19.

1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres Praksis?	1/8 1918.
2. Hvorfra formoder De, at den er indført?	Fra en Nabopraxis.
3. Skolerenes Betydning for Sygdommens Udbredelse?	Skolerne har i nogen Grad haft Betydning for Sygdommens Udbredelse, men Skolerne er ogsaa blevet lukket i 8 Dage, saa snart eet sikkert tilfælde af Smitteoverførsel i dem var konstateret.
4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.	Selskabeligheder, særligt Bal, har haft overordentlig stor Betydning, for Overførelse af Smitte. Ved et Bal, hvor der sikkert kun har været 2-3 yderst let angrebne Patienter med, smittedes cirka 100 Personer, og Epidemien bredte sig derefter med rivende hast og tiltog i Voldsomhed (mortalitet = 1%).
5. Sygdommens Optraeden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. l.?	-
6. Boligforholdenes Betydning?	Jo mindre Værelser desto lettere Smitteoverførelse; i øvrigt intet særligt bevist m.h.t. boligforholdenes betydning.
7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?	Nej.
8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?	Ja, tilsyneladende.

Klik på billedet for at se den originale kilde

1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres praksis?	1/8 1918
2. Hvorfra formoder De, at den er indført?	Fra en Nabopraxis
3. Skolerenes Betydning for Sygdommens udbredelse?	Skolerne har i nogen, men dog kun ringe Grad, haft Betydning for Sygdommens udbredelse, men Skolerne er ogsaa blevet lukket i 8 Dage, saa snart eet sikkert tilfælde af Smitteoverførsel i dem var konstateret.
4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.	Selskabeligheder, særligt Bal, har haft overordentlig stor Betydning, for Overførelse af Smitte. Ved et Bal, hvor der sikkert kun har været 2-3 yderst let angrebne Patienter med, smittedes cirka 100 Personer, og Epidemien bredte sig derefter med rivende hast og tiltog i Voldsomhed (mortalitet = 1%)
5. Sygdommens Optraeden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. l.?	-
6. Boligforholdenes Betydning?	Jo mindre Værelser desto lettere Smitteoverførelse; i øvrigt intet særligt bevist m.h.t. boligforholdenes betydning.
7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?	Nej
8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?	Ja, tilsyneladende.

INDBERETNING NR. 9



Klik på billedet for at se den originale kilde

<p>9. Smittefare ved den Sygdommen ledsagende Pneumoni?</p>	<p>menes ikke at være stor</p>
<p>10. Kan Rekonvalescenter smitte?</p>	<p>Ja</p>
<p>11. Overføres Sygdommen med sine specifikke Ejendommeligheder, for Eks. med Tilbøjelighed til Pneumoni?</p>	<p>Ja, man ser ofte flere Tilfælde af Pneumoni hos Personer smittede af en og samme Influenzapatient med Pneumoni</p>
<p>12. Er gravide særligt udsatte for Smitte?</p>	<p>Nej</p>
<p>13. Har Profylaxen nogen Betydning (Isolation, Ansigtmaske o. l.)</p>	<p>Ja, Isolation. Ansigtsmaskens Betydning problematisk. Af stor betydning er det, at Afstanden mellem patient og den for smitten udsatte er stor, helst 2-3 meter.</p>
<p>14. Har De set Personer, der sikkert havde Influenza i 1889-95, blive angrebne i denne Epidemii?</p>	<p>1. tilfælde: vedkommende paastod, at han som Barn havde Influenza i 90 eller 91.</p>
<p>15. Har De set samme Person blive angrebet flere gange i denne Epidemii?</p> <p>Med hvor langt Melletrum? Var de senere Anfald sværere eller lettere?</p>	<p>Ja, saavel gentagne ganges genopblussen som Influenza efter Reinfektion</p> <p>Med fra 2 uger til flere maaneders melletrum. I enkelte tilfælde var de senere anfald sværere og stærkere smitsomme end det første.</p>
<p>16. Har Epidemien efterhaanden skiftet Karakter? Har den under sin senere Oplussen givet flere og mere ondartede Komplikationer end i Begyndelsen?</p>	<p>Ja angriber nu hyppigere ældre Personer. i Begyndelsen angreb den sjældent Personer over 60 aar. En Epidemii her paa Egnen fra 1 ste april 1919 viste stærkere Komplikationer særligt over sommer var adskillige Pneumonier.</p>
<p>17. Har De set Tilfælde hvor De med Sikkerhed kan angive Inkubationstiden?</p>	<p>Ja, ved 2 Epidemier stammende fra Bal viste Sygdomsudbruddet sig konstant fra 2-2 ½ Døgn efter Infektionen</p>
<p>18. Hvordan begyndte Sygdommen?</p> <p>Næseblødning</p> <p>Snue</p> <p>Laryngit, tracheit, bronch.</p> <p>Gastro-int. Symp.</p>	<p>I næsten alle tilfælde med Feber, Snue. Injektion af conjunctiva, angina og Pandre. Hovedpine (mindre konstant fremkomst i Landregionen)</p> <p>det almindeligt, men ikke som Initialsymptom</p> <p>Ja</p> <p>ret almindelige</p> <p>sjældne</p>
<p>19. Komplikationer og Følgesygdomme</p> <p>Pneumoni</p> <p>Empyem</p> <p>Pleuritis</p> <p>Endocarditis</p>	<p>ret almindelig, mest fra 3.- 4. Døgn.</p> <p>Intet Tilfælde</p> <p>—</p> <p>—</p>

INDBERETNING NR. 9

Pericarditis	0.
Myocarditis	3 Tilfælde.
Peritonitis	0.
Meningitis	2 Tilfælde.
Otitis	almindelig
Parotitis	0.
Conjunctivitis	overordentlig hyppig.
Eklampi	0. 1 Tilfælde.
Psyriske Forstyrrelser	1 Tilfælde.
Sygdomme i Genitalia	0.
Abort eller for tidl. Føds.	for tidl. Fødsel af Tvillinger 1 Tilfælde.
Icterus	enkelte lettere Tilfælde.
Miltsvulst	0.
Nephritis-Albuminuri	enkelte lettere Tilfælde.
Phlebitis	0.
Exanthen	0.
Furunculose	0.
Haaraffald	2-3 Tilfælde.
Andre Komplikationer	0.

for tidligt indtrædende og stærke menses flere tilfælde.

Sygdommens Begyndelse i Regelen som nævnt under Punkt 18. Feberen ikke sjældent stigende i 1ste dogn. I enkelte Tilfælde var Patientens feberfri paa 1 Døgn næsten altid først efter een eller flere voldsomme Svedeture. Katoren i Næse og svælg bredte sig næsten altid til Bronkierne og ofte til de finere Forgreninger saa at man f. Eks. paa større Flader hørte Tubærepitation og crepitation, uden dæmpning. Temperaturfaldet svært lytisk snart kritisk paa fra 3 - 7-8 Døgn.

20. Sygdommens Forløb?

21. Rekonvalescents?

22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særligt Tuberculose, Hudsygdomme o.a.)

Synes at forværre tilstedeværende Lungetuberculose.

Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.

Datum: 30. 5. 1919.

Bopæl og Adresse: Gylling.

Klik på billedet for at se den originale kilde

Pericarditis	0.
Myocarditis	3 Tilfælde
Peritonitis	0
Meningitis	2 Tilfælde
Otitis	almindelig
Parotitis	0
Conjunctivitis	overordentlig hyppig
Eklampi	1 Tilfælde
Psyriske forstyrrelser	1 Tilfælde
Sygdomme i Genitalia	0
Abort eller for tidligt Fødsel	For tidl. [tidlig] Fødsel af Tvillinger 1 Tilfælde
Icterus	Enkelte lettere Tilfælde
Miltsvulst	0
Nephritis - Albuminuri	Enkelte lettere Tilfælde
Phlebitis	0
Exanthen	0
Furunculose	0
Haaraffald	2-3 Tilfælde
Andre komplikationer	For tidligt indtrædende og stærke menses flere tilfælde
20. Sygdommens Forløb	Sygdommens Begyndelse i Regelen som nævnt under Punkt 18. Feberen ikke sjældent stigende i 1 ste dogn. I enkelte Tilfælde var Patientens feberfri paa 1 Døgn næsten altid først efter een eller flere voldsomme Svedeture. Katoren i Næse og svælg bredte sig næsten altid til Bronkierne og ofte til de finere Forgreninger saa at man f. Eks. paa større Flader hørte Tubærepitation og crepitation, uden dæmpning. Temperaturfaldet svært lytisk snart kritisk paa fra 3 - 7-8 Døgn.
21. Rekonvalescents?	Ofte langvarig særlig karakteriseret ved daarlig helse, Lændesmerter, tilbøjelighed til Transpiration.
22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særligt Tuberculose, Hudsygdomme o.a.)	Synes at forværre tilstedeværende Lungetuberculose
Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.	

Datum: 30.5.1919.

J. Didriksen

Bopæl og Adresse: Gylling